

GEL DI AGAROSIO: FILLER A TOTALE RIASSORBIMENTO

Il gel di agarosio è una sostanza iniettabile, a totale riassorbimento, utilizzata nei trattamenti estetici del viso, quali la correzione delle rughe, dei solchi, l'aumento dei volumi ed il miglioramento estetico delle labbra.

Studi clinici preliminari hanno dimostrato una maggiore durata rispetto ad altre sostanze iniettabili e riassorbibili (fino a 12 mesi dalla data dell'impianto come massimo, in media 6-9 mesi; dopo questo tempo e comunque in maniera progressiva le zone trattate riassumeranno l'aspetto precedentemente avuto); questo è dovuto al lento riassorbimento in cui i sistemi enzimatici intervengono dopo la rimozione del gel dal sito di applicazione da parte dei macrofagi.

Solo un medico può effettuare il trattamento con gel di agarosio che può essere eseguito in un ambulatorio medico senza la necessità di attrezzature particolari e richiede normalmente 30 minuti; non è richiesto un test preliminare al trattamento, dopo un'accurata anamnesi il medico infila il gel con aghi molto sottili sotto le rughe da correggere o nelle aree dove si desidera aumentare il volume (in caso di trattamento alle labbra viene eseguita un'anestesia locale tipo quelle utilizzate per i trattamenti odontoiatrici); generalmente il risultato estetico è immediatamente visibile e l'impianto non è particolarmente doloroso.

Il gel di agarosio viene iniettato nel derma e dopo il trattamento si possono presentare alcuni effetti collaterali; tra i più comuni si ricorda un transitorio eritema (arrossamento), dolorabilità, prurito ed edema (gonfiore), ecchimosi ed ematomi (lividi), ipercorrezioni, reazioni acneiformi e lieve colorazione bluastra delle parti sottoposte a trattamento e risolvendosi in genere nell'arco di 24-72 ore o alcuni giorni.

In casi più rari viene segnalata l'insorgenza di nodularità nelle sedi di impianto risolubili con semplici massaggi; in ogni caso è bene informare il proprio medico per una corretta valutazione.

Rara ma possibile, soprattutto nei casi in cui non vengono rispettate le indicazioni del medico per quanto riguarda il periodo dell'immediato post-impianto (non esporsi a polvere, vapore, calore, basse temperature, evitare il trucco per 48-72 ore), è l'infezione (con eventuali ascessi da drenare) comunque risolubile in caso di materiali riassorbibili con un'opportuna terapia antibiotica sistemica e locale.

Una procedura di ritocco dopo un periodo che varia da 1 a 3 settimane dopo il primo trattamento contribuisce ad ottimizzare i risultati ed a massimizzare la durata.

Il trattamento con gel di agarosio è controindicato nei seguenti casi:

- Soggetti atopici e ipersensibilità a componenti presenti nei preparati
- Patologie autoimmuni
- Gravidanza ed allattamento
- Dermatiti virali o batteriche
- Predisposizioni a reazioni cheolidee
- Endocarditi o angina cronica
- Patologie psichiatriche accertate

Prima del trattamento bisogna informare il medico di eventuali trattamenti precedenti con altri filler. Dopo il trattamento è consigliabile evitare il trucco sulle aree trattate per 48-72 ore e si consiglia di evitare inoltre per due settimane bagni turchi e saune, fumo, alcol, esposizioni prolungate a basse ed alte temperature e ai raggi UV (sole e/o lampade) o esercitare forti pressioni con le mani sulle aree trattate. Si sconsiglia l'uso dell'aspirina o simili nei giorni che precedono e seguono il trattamento.

