

ACIDO IALURONICO: FILLER A TOTALE RIASSORBIMENTO

L'acido ialuronico è un "filler" (riempiente) a completo riassorbimento, cioè ha la proprietà di essere degradato completamente dalle strutture enzimatiche presenti nella cute umana in un lasso di tempo variabile. L'acido ialuronico è disponibile in diverse formulazioni commerciali in siringhe STERILI PRERIEMPIUTE per la correzione di rughe del viso (dalle più sottili a quelle profonde), per la correzione di solchi, volumi del viso e per il miglioramento estetico delle labbra.

Solo un medico può effettuare il trattamento con acido ialuronico che può essere eseguito in un ambulatorio medico senza la necessità di attrezzature particolari e richiede normalmente 30 minuti; non è richiesto un test preliminare al trattamento, dopo un'accurata anamnesi il medico inietta il gel di acido ialuronico con aghi molto sottili sotto le rughe da correggere o nelle aree dove si desidera aumentare il volume (in caso di trattamento alle labbra viene eseguita un'anestesia locale tipo quelle utilizzate per i trattamenti odontoiatrici); generalmente il risultato estetico è immediatamente visibile e l'impianto non è particolarmente doloroso.

Come qualsiasi altro materiale da impianto riassorbibile ed iniettabile, l'acido ialuronico può presentare alcuni effetti collaterali; tra i più comuni si ricorda un transitorio eritema (arrossamento), dolorabilità, prurito ed edema (gonfiore), ecchimosi ed ematomi (lividi), ipercorrezioni, reazioni acneiformi delle parti sottoposte a trattamento e risolvendosi in genere nell'arco di 24-72 ore o alcuni giorni.

In casi più rari viene segnalata l'insorgenza di nodularità nelle sedi di impianto risolvibili con semplici massaggi; in ogni caso è bene informare il proprio medico per una corretta valutazione.

Rara ma possibile, soprattutto nei casi in cui non vengono rispettate le indicazioni del medico per quanto riguarda il periodo dell'immediato post-impianto (non esporsi a polvere, vapore, calore, basse temperature, evitare il trucco per 48-72 ore), è l'infezione (con eventuali ascessi da drenare) comunque risolvibile in caso di materiali riassorbibili con un'opportuna terapia antibiotica sistemica e locale.

La durata del trattamento è variabile in base al tipo di acido ialuronico utilizzato ma anche in base alla frequenza con cui viene sollecitata la zona di impianto, in base allo stress, al metabolismo individuale e alla sede di impianto; in media possiamo considerare un tempo di circa 3-8 mesi; dopo questo tempo e comunque in maniera progressiva le zone trattate riassumeranno l'aspetto precedentemente avuto.

Il trattamento con acido ialuronico è controindicato nei seguenti casi:

- Soggetti atopici e ipersensibilità a componenti presenti nei preparati
- Patologie autoimmuni
- Gravidanza ed allattamento
- Dermatiti virali o batteriche
- Predisposizioni a reazioni cheloidiche
- Endocarditi o angina cronica
- Patologie psichiatriche accertate

Prima del trattamento bisogna informare il medico di eventuali trattamenti precedenti con altri filler. Dopo il trattamento è consigliabile evitare il trucco sulle aree trattate per 48-72 ore e si consiglia di evitare inoltre per due settimane bagni turchi e saune, esposizioni prolungate a basse ed alte temperature e ai raggi UV (sole e/o lampade) o esercitare forti pressioni con le mani sulle aree trattate. Si sconsiglia l'uso dell'aspirina o simili nei giorni che precedono e seguono il trattamento.

